

日本赤十字社 東京都支部
健康安全課

【オンライン講習】赤十字幼児安全法

- ・乳幼児の一次救命処置
- ・乳幼児の起こりやすい事故と
応急手当



1

日本赤十字社 東京都支部

本日の講義内容

＜乳幼児の一次救命処置＞

1. 日本赤十字社について
2. 乳幼児の一次救命処置を学ぶ前に
3. 乳児の心肺蘇生・AED
4. 乳児の気道異物除去
休憩
5. 幼児の心肺蘇生・AED
6. 幼児の気道異物除去
7. コロナ禍における指針

＜乳幼児の起こりやすい事故と手当＞

8. 子どもの成長と発達
起こりやすい事故について
9. 応急手当について
10. ふりかえり



2

日本赤十字社 東京都支部

1. 日本赤十字社について

3

日本赤十字社について

3つの活動領域



いのちを救う

せいかつを支える

ひとを育む

世界中で苦しんでいる
ひとりでも多くの人を、救いたい。

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

4

日本赤十字社について

いのちを救う

- 国内災害救護
- 医療事業
- 救急法などの講習
- 国際活動
- 血液事業

せいかつを支える

- 社会福祉
- 赤十字ボランティア

ひとを育む

- 青少年赤十字
- 看護師などの教育




Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

5

日本赤十字社 東京都支部

2. 乳幼児の一次救命処置を学ぶ前に

6

乳児の心肺蘇生・AED

手順4 協力者を求める



だれか来てください！
119番通報してください！
AED持ってきてください！


119番通報をすると、
通信司令員から
口頭指導を受けることができます。

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

13

乳児の心肺蘇生・AED

手順5 呼吸の確認



【ポイント】
・普段通りの呼吸であるか
・胸とおなかの動きを見て
・10秒以上かけないで
確認する。

【呼吸数の目安】1分間に30～60回

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

14

乳児の心肺蘇生・AED

手順6 胸骨圧迫

圧迫部位



胸骨の下半分

圧迫の方法



【ポイント】
・2本指の指先を垂直に立てて、垂直に押す
・傷病児の顔などを観察しながら行う

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

15

乳児の心肺蘇生・AED

手順6 胸骨圧迫



Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

16

乳児の心肺蘇生・AED

胸骨圧迫のポイント

- ・強く
※胸の厚みの約1/3を目安として、胸が十分に沈み込む程度
- ・速く
※100～120回/分のテンポ
- ・絶え間なく
※交代時など中断時間はなるべく少なく



Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

17

乳児の心肺蘇生・AED

手順7 気道確保・人工呼吸



気道確保
(頭部後屈あご先挙上)



人工呼吸
口と鼻を一緒に覆って
吹き込む


乳児の首(頸部)は非常に柔らかいので、無理に頭部を後屈しない

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

18



19



20




21



22



23



24

乳児の心肺蘇生・AED

手順8 心電図の解析・電気ショック

【実技】AED準備～電気ショック
一緒にやってみましょう！

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

25

4. 乳児の気道異物除去

26

乳児の気道異物除去

119番通報

のどに物を詰まらせた

処置/対応

気道異物除去
○背部叩打法
○胸部突き上げ法
※反復実施

異物が除去された

注意深く見守る

医師の診察を受けさせる

反応(意識)がなくなった

心肺蘇生を実施
※一次救命処置の手順
※胸骨圧迫は異物除去の効果もある
※途中で異物が見えた場合は取り除く

救急隊に引き継ぐ

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

27

乳児の気道異物除去

背部叩打法

片手で乳児を支え、もう一方の手の手掌基部で
背中の中を叩く

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

28

乳児の気道異物除去

胸部突き上げ法

①片方の腕に乳児の背中を乗せる
②手のひら全体で後頭部をしっかり持つ
③もう一方の手の指2本で、胸の真ん中を力強く
数回圧迫する

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

29

乳児の気道異物除去

背部叩打法

胸部突き上げ法

【実技】背部叩打法・胸部突き上げ法
一緒にやってみましょう！

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

30



31



32

幼児の心肺蘇生・AED

手順3 反応(意識)の確認

【ポイント】
肩をたたきながら、耳元で声をかける
☆引きつるような動き(けいれん)は反応なし

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

33

幼児の心肺蘇生・AED

手順4 協力者を求める

だれか来てください！
119番通報してください！
AED持ってきてください！

119番通報をすると、
通信司令員から
口頭指導を受けることができます。

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

34

幼児の心肺蘇生・AED

手順5 呼吸の確認

【ポイント】
・普段通りの呼吸であるか
・胸とおなかの動きを見て
・10秒以上かけないで
確認する。

【呼吸数の目安】1分間に20～40回

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

35

幼児の心肺蘇生・AED

手順6 胸骨圧迫

圧迫部位

圧迫の方法

【ポイント】
・片手でも両手でもかまわない
・傷病児の顔などを観察しながら行う

36

幼児の心肺蘇生・AED

胸骨圧迫のポイント

- ・強く
※胸の厚みの約1/3を目安として、胸が十分に沈み込む程度
- ・速く
※100～120回/分のテンポ
- ・絶え間なく
※交代時など中断時間はなるべく少なく



Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

37

幼児の心肺蘇生・AED

手順7 気道確保・人工呼吸



気道確保
(頭部後屈あご先挙上)



人工呼吸
鼻をつまみ、口を覆うように密着させる

乳幼児の首(頸部)は非常に柔らかいので、無理に頭部を後屈しない

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

38

幼児の心肺蘇生・AED



胸が上がるのがわかる程度の量を吹き込み
吹き込んだ息を自然に出させる

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

39

幼児の心肺蘇生・AED

胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ



胸骨圧迫30回
人工呼吸2回

人工呼吸をする技術がない
または
意思を持たない場合は、胸骨圧迫を続けます。


【実技】反応の確認～胸骨圧迫～人工呼吸
一緒にやってみましょう！

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

40

幼児の心肺蘇生・AED

手順8 電極パッドを貼り付ける



【ポイント】
①心臓を挟み込むような位置に貼る。
②体に密着させて貼る。

【実技】反応の確認～AED操作まで
一緒にやってみましょう！


Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

41

幼児の心肺蘇生・AED

心肺蘇生を中止して良い場合

- (1) 傷病者が(嫌がって)動き出す、うめき声を出す、見るからに普段どおりの呼吸が現れた場合。
- (2) 救急隊(あるいは専門の救護者)に傷病者を引き継ぐことが出来る場合。
- (3) 救助者に疲労や危険がせまり、心肺蘇生の継続が困難になった場合。




回復体位

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. all rights reserved.

42

6. 幼児の気道異物除去



43

44

幼児の気道異物除去

背部叩打法



素早く抱きかかえるか、または大腿部で支え、頭を低くして手掌基部で背中を叩く

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. All rights reserved.

45

幼児の気道異物除去

腹部突き上げ法



① 幼児の後ろから腹部に腕をまわし、一方の手で握りこぶしの親指側を幼児の上腹部に当てる

② もう一方の手で握りこぶしの親指側を幼児の上腹部に当てる

③ 上腹部を内上方に向かって突き上げる。

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. All rights reserved.

46

7. コロナ禍における指針

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえて

厚生労働省【新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)】 2020年5月

【基本的な考え方】

○ 新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、全ての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応する。

○ 成人の場合は人工呼吸を行わず胸骨圧迫とAEDを実施。

○ 子どもの場合は、人工呼吸の知識と技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には、人工呼吸も実施する。

※ 子どもの心停止は、窒息や溺水など呼吸障害を原因とすることが多く、人工呼吸の必要性が高い。

Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO. All rights reserved.

47

48

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえて

【救急蘇生法の具体的手順】

- 「反応の確認」や「呼吸の観察」の際、**傷病者の顔と救助者の顔が近づきすぎない。**
- 胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどで傷病者の鼻と口にかぶせる。**(マスクや衣類でも可)
- 成人の場合は人工呼吸の意思がある場合でも、人工呼吸を行わず胸骨圧迫とAEDを実施。**
- 子どもの場合は、人工呼吸の知識と技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には、胸骨圧迫に人工呼吸を組み合わせる。**その際、手元に人工呼吸用の**感染防具**があれば使用する。
- 救急隊に引き継いだあとは、速やかに**石鹸と流水で手と顔を洗う。**傷病者の鼻と口にかぶせたハンカチやタオルは、**直接触れないようにして破棄。**



Copyright © 2020 Japanese Red Cross TOKYO, all rights reserved.


49

〈乳幼児の起こりやすい事故と手当〉

8. 子どもの成長と発達
起こりやすい事故について

50

精神・運動機能の発達と起こりやすい事故



51

9. 応急手当について

- ・きずについて
- ・頭部のけが
- ・骨折
- ・異物の誤飲・誤嚥

52

きずについて

こんなときに、どうしたらよいでしょう。

- ・転んでひざをすりむいたとき
- ・カッターナイフで手を切ったとき
- ・とがったものを踏んでしまったとき




まず「痛かったね。もう大丈夫？」など、子どもにやさしく聞いてみましょう。

53


きずの手当

(1) きずの危険性

- ・出血
- ・痛み
- ・細菌感染(化膿)



54



55

日本赤十字社 東京救急科
JAPANESE RED CROSS SOCIETY

(3)包帯について

【保護ガーゼの効果】

- ・圧迫による出血防止(止血) ・血液や分泌物の吸収
- ・きずの清潔保持(感染防止)
- ・きずの安静による苦痛の軽減

【包帯の目的】

- ・きずに当てた保護ガーゼの支持固定
- ・副子の固定 ・手や腕を吊る
- ・強く巻くことにより、出血を止める

56

日本赤十字社 東京救急科
JAPANESE RED CROSS SOCIETY

頭部のけが

何で、どこで、どんな具合に打ったのか、どれぐらいの高さから落ちたのか知ることが重要
頭部以外のけがを見落とさないように注意

57

日本赤十字社 東京救急科
JAPANESE RED CROSS SOCIETY

頭部のけが

まず心配ないと思うが様子を見るとき

頭を打ってすぐに泣きだしたが、15分くらいで泣きやみ、顔色も悪くなく吐き気もなく、よく食べたり飲んだりしている。いつもと変わったことはなく、機嫌がよい

◆手当◆

- ・安静にして様子を見る
- ・わずかな出血は直接圧迫止血で様子みる
- ・数日、よく観察する

58

日本赤十字社 東京救急科
JAPANESE RED CROSS SOCIETY

頭部のけが

以下のような症状がある時は119番通報

- ・意識がない ・呼吸が乱れている
- ・耳、鼻、口などから血液や体液の流出
- ・吐く ・けいれんがある ・頭痛、発熱
- ・目つきがおかしい ・手や足を動かせない

◆手当◆

- ・ゆずぶったり、乱暴に扱ってはならない
- ・耳・鼻にはものをつまめない
- ・吐くときは、窒息させない体位
- ・意識がないときは、一次救命処置

59

日本赤十字社 東京救急科
JAPANESE RED CROSS SOCIETY

骨折

症状

- 痛みのため激しく泣く
- 腫れ ○変形
- 皮膚の変色(内出血)など

◆手当◆

- ・全身及び骨折部を安静にする
- ・きずがある時は、清潔なガーゼを当てる
- ・骨折部を固定する
- ・医療機関へ連れていく

60

日本赤十字社 東京救済科

固 定

患部や患部の上下の関節を固定

- 患部の痛みを和らげる
- 出血を防ぐ
- 新たなきずがつくことを防ぐ

副 子

骨折部の動揺を防ぐために手や足に当てる**支持物**、十分な**長さ**、**強さ**、**幅**を持つもの




61

日本赤十字社 東京救済科

異物の誤飲・誤嚥

誤飲: **飲食物でないもの**を飲み込んだ場合
誤嚥: 飲み込んだものが**気道**にはいつてしまう場合



(1) 誤飲

たばこ、洗剤、電池、玩具など身の回りにあるものが原因になる。

中毒症状を引き起こしたり、粘膜を傷つけたりする場合がある

62

日本赤十字社 東京救済科

異物の誤飲・誤嚥

ア) 医薬品や化学物質など中毒症状を引きおこすものを飲み込んだ時

◆手当◆

- 119番**、医療機関あるいは**日本中毒情報センター**などに連絡し、**指示**を受ける
- 飲んだものや吐いたものが残っていれば、医師にみせる

〈意識がある時〉

指示を受けて、水などを飲ませて、指を口の中に入れ、舌の奥を下に押し、吐かせる

63

日本赤十字社 東京救済科

異物の誤飲・誤嚥

※次の場合は吐かせてはいけない

- 意識がないとき**
- けいれんがある時
- 強酸性**、**強アルカリ**のもの(特に洗剤など)を飲んだ場合、唇や口のまわりに飲んだものでただれが有る場合

〈意識がない時〉

- 119番通報**する
- 気道確保**する
- 吐いたものが気管に入らないよう**回復体位**
- 呼吸困難に陥ったときは、乳幼児の**一次救命処置**の手順で手当をする

64

日本赤十字社 東京救済科

異物の誤飲・誤嚥

イ) 電池、玩具、鋭利なものなどの固形物を飲込んだ時

◆手当◆

- ボタン型電池**、画鋸、釘、ガラスの破片など鋭利なもの場合は、急いで**医療機関**へ

(2) 誤嚥

アメなどの飲食物やボタン・電池などが**気道に入る場合**のほか、胃の中のものが**逆流**する場合がある

65

日本赤十字社 東京救済科

10. ふりかえり

66

日本赤十字社 東京部会
Japan Red Cross Society

オンライン動画等のご紹介

日本赤十字社では「一次救命処置（BLS）～心肺蘇生とAED～」の動画をWeb上で公開するほか、電子学習室「WEBCROSS」を開設しています。復習等にご活用ください。

【日本赤十字社HP「とっさの 手当・予防を学びたい」】
<http://www.jrc.or.jp/activity/study/safety/>

【電子講習室「WEBCROSS」】
<https://www.tokyo.jrc.or.jp/application/webcross/index.html>



一次救命処置(BLS)
JRCに蘇生法オンライン2020対応



心肺蘇生・AED
～市民がつかなく救命の連鎖～



オンライン講習 開講中!


乳幼児の一次救命処置
～心肺蘇生・AED・気道異物除去～



オンライン講習開講中

Copyright© 2020 Japan Red Cross TOKYO all rights reserved.

67



68

日本赤十字社 東京部会
Japan Red Cross Society

オンライン講習・受講者アンケート 「受講証」発行の登録について



- ・ 日本赤十字社東京都支部オンライン講習救急法短期講習(心肺蘇生+AED)に参加いただきまして有難うございました。
- ・ 今回の受講時の感想をお聞かせいただき、今後の講習活動に反映したいと考えております。
- ・ アンケートにご回答いただきますと、回答後10分以内に「受講証」をメールでお送りいたします。
- ・ QRコードを読み取って、アンケートに回答願います。

Copyright© 2020 Japan Red Cross TOKYO all rights reserved.

69